

Produção de leite de ovelhas primíparas da Raça Crioula

MENINE, E. V.¹, CAMPONOGARA, G.R.¹, BRUM, N.S.¹, WOMMER, T.P.¹

¹ Instituto Federal Farroupilha (IFFar) – Alegrete – RS – Brasil – tatiana.wommer@iffarroupilha.edu.br

RESUMO

A produção de leite é um dos principais indicadores de desempenho na ovinocultura, sendo fundamental para o desenvolvimento dos cordeiros, especialmente nas primeiras semanas de vida. Mesmo que a raça Crioula não possua aptidão para produção leite, sua capacidade de produção é de grande importância, pois garante a nutrição dos cordeiros. Desta forma, o presente projeto teve como objetivo avaliar a produção de leite de ovelhas primíparas da raça Crioula. O projeto foi realizado no Setor de Ovinos do IFFar, Campus Alegrete, entre os meses de agosto e outubro de 2025. Foram utilizadas 9 ovelhas primíparas. Para determinação da produção de leite as ovelhas foram ordenhadas, mediante aplicação de 2 ml de ocitocina, esgotadas (retirada total do leite da glândula mamária) e após um intervalo de três horas, foram novamente ordenhadas após aplicação de ocitocina, para então se determinar a produção de leite. A quantidade de leite produzida neste intervalo de três horas foi multiplicada por oito para estimativa da produção diária de leite. Foram medidas as oito primeiras semanas de lactação. Os resultados indicaram variação produtiva ao longo do período avaliado, com maiores valores observados nas ordenhas iniciais, sendo a segunda semana de lactação observado o pico de lactação com produção diária média por matriz de 1,3 litros. Nas últimas semanas de lactação foram mensuradas produções inferiores, sendo determinado na oitava semana valores médios de 0,840 litro por matriz. Sabe-se que para um cordeiro que está recebendo somente leite materno, é necessário uma média de 4 litros de leite para produzir 1 kg de ganho de peso. Levando em consideração que neste trabalho as ovelhas atingiram uma média de 1,3 litros de leite/dia no pico da lactação, seriam necessários cerca de três dias para os cordeiros ganharem 1kg. Sendo assim, conclui-se que ovelhas primíparas da raça Crioula apresentam variação na produção de leite ao longo da lactação, com melhor desempenho nas fases iniciais. Apesar de não possuir aptidão leiteira, a raça demonstra produção suficiente para garantir o desenvolvimento dos cordeiros. Entretanto, faz-se necessário estratégias nutricionais, para desmamar cordeiros mais pesados, bem como seleção de matrizes que apresentam maior produção de leite, evidenciada pelo maior peso de desmame de suas crias.

Palavras-chave: Ordenha, cordeiro, lactação.